



Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Fakultät für Klinische Medizin Mannheim
Dissertations-Kurzfassung

**Ein-Jahres Ergebnisse nach Fasziektomie und
Vakuumversiegelung in der Therapie des chronischen Ulcus cruris
venosum**

Autor: Markus Korte
Einrichtung: Chirurgische Klinik
Doktorvater: Prof. Dr. H. Thiele

In dieser Arbeit wird ein neues operatives Verfahren und dessen Ein-Jahres Ergebnisse beschrieben.

Zwischen Februar 1996 und Mai 1997 wurden 23 Patienten mit therapierefraktären chronischen Stauungslucera der Unterschenkel, die 8 - 25 Jahre bestanden, einer ausgedehnten Ulcusexcision mit simultaner Fasziektomie und anschließender Vakuumversiegelung unterzogen. Eine plastische Deckung der Defekte konnte nach durchschnittlich 10,9 Tagen mit Spalthaut vom Oberschenkel bei einem Krankenhausaufenthalt von im Mittel 46,5 Tagen erfolgen. Die Ein-Jahres Ergebnisse konnten von 18 bzw. 15 dieser Patienten ermittelt werden. Keiner der Patienten hatte innerhalb dieses Jahres ein Ulcusrezidiv oder befand sich wegen des Ulcus cruris in stationärer Behandlung. Alle berufstätigen Patienten waren wieder arbeitsfähig. Während 3 Patienten völlig beschwerdefrei waren, gaben die restlichen 15 eine deutliche Besserung der Symptomatik an. 17 von 18 Patienten würden sich diesem Eingriff unter den selben Bedingungen wieder unterziehen, so daß diese technisch einfache Verfahren auch aus ökonomischer Sicht als Methode der Wahl zu empfehlen ist.